

Comedones perianales: serie de casos de cinco pacientes y una posible asociación con quistes perianales previamente descrita

P. Aarts¹ & Hessel H. van der Zee¹

1. Department of Dermatology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands

Autor para correspondencia:

Pim Aarts,

Dirección de correo electrónico: p.aarts@erasmusmc.nl

Sr. Director:

Hemos leído con gran interés el artículo recientemente publicado titulado "Comedones perianales: ¿variante de hidradenitis supurativa o una entidad aislada? Serie de 5 casos," en *Actas Dermo-Sifiliográficas*¹. El artículo describe cinco casos de lesiones perianales caracterizadas por taponamiento folicular, comedones abiertos y cerrados, y quistes. De manera notable, la mayoría de los pacientes eran hombres (n = 4/5), con hidradenitis supurativa (HS) concomitante en cuatro casos, e historia de tabaquismo (activo o antiguo) en todos los pacientes. Los autores sugieren que esta presentación puede representar una entidad distinta o una variante leve de HS, exacerbada potencialmente por el tabaco.

Encontramos que este artículo era particularmente convincente, ya que sus hallazgos coinciden estrechamente con los reportados en nuestro informe de caso previamente publicado: "The Cystic Sponge Anus"². En dicho informe, describimos un paciente con HS que acudió con múltiples orificios y cavidades, originando un aspecto esponjoso de la piel perianal junto con múltiples quistes y comedones (gigantes). De manera similar a los casos descritos en el artículo, nuestro paciente también era un fumador activo y tenía HS concomitante. Nosotros conjeturamos que la textura esponjosa se derivaba de la descamación espontánea del contenido quístico. A pesar de que esta característica esponjosa específica no se observó en los casos de nuevo reporte, sospechamos que la discrepancia puede ser atribuible a las diferencias en cuanto a tamaño de las oclusiones foliculares.

Los casos nuevamente descritos parecen representar una forma más leve del ano esponjoso quístico. Proponemos que estos casos, y el de nuestro paciente previamente reportado, pueden reflejar variaciones de la misma entidad subyacente, representando los casos de nueva presentación una fase menos severa caracterizada por oclusiones de menor tamaño. Colectivamente, dichos casos respaldan el concepto de una nueva entidad que implica oclusión perianal, potencialmente vinculada a HS, sexo masculino y hábito tabáquico.

Referencias

1. Fabregat-Pratdepadua M, Mora Fernández V, Verdaguer-Faja J , Bassas Vila J. Perianal comedones: a variant of hidradenitis suppurativa or an isolated entity? Five-case report

Comedones perianales: ¿una variante de hidradenitis supurativa o una entidad per se? Serie de 5 casos. *Actas Dermosifiliogr* 2024.

2. van der Zee HH , Aarts P. The Cystic Sponge Anus. *Case Rep Dermato* 2024;16:94-6.