

Patrón globular irregular de la cresta en el melanoma acral.

Isabel María Coronel-Pérez¹, David Casado-Gómez², Laura Pedraza-Gil³

Afiliación de los autores:

¹ Dermatología Hospital Universitario de Valme (Sevilla).

² Medicina Familiar y Comunitaria. CS Coripe. UGC Montellano (Sevilla).

³ Medicina Familiar y Comunitaria. CS Utrera Sur (Sevilla).

Nombre, dirección y e mail del autor de correspondencia:

Isabel María Coronel-Pérez

Servicio de dermatología del Hospital de Valme

Carretera de Cádiz km 548. 41014 Sevilla (Spain)

e-mail: mcoronelperez@hotmail.com

Una mujer de 80 años consultó por una lesión pigmentada localizada en su arco plantar izquierdo de un tiempo de evolución incierto sobre la que le había alertado su podólogo. En la exploración se observó una placa pigmentada plana, de 2 cm, con unos bordes irregulares, de un color marrón oscuro en la periferia y gris azulado en el centro. Con dermatoscopia se constató un patrón multicomponente constituido por un patrón paralelo de la cresta, un velo azul-blanquecino y unos glóbulos atípicos que llamativamente se disponían en la cresta del dermatoglifo en la periferia de la lesión. El estudio histopatológico fue de un melanoma no ulcerado de 1,6 mm de Breslow.

El patrón dermatoscópico clásicamente asociado al melanoma acral es el patrón paralelo de la cresta, pero se puede encontrar también pigmentación difusa, patrón multicomponente, fibrilar o en celosía irregular. Histopatológicamente los glóbulos que se observan en la dermatoscopia se corresponden con nidos de melanocitos localizados en la unión dermoepidérmica o que se eliminan a través del estrato córneo. En general, se puede encontrar glóbulos atípicos con distribución irregular en los melanomas, pero también están descritos con una distribución peculiar en las crestas, lo que se denomina “patrón globular irregular principalmente localizado en las crestas”. El diagnóstico diferencial son los nevos congénitos, donde los glóbulos se distribuyen regularmente, a veces acompañados por un patrón paralelo del surco formando el denominado “patrón de guisantes en sus vainas”.

