

Material adicional

Figura S1. Total de dispositivos tipo balón farmacoactivo usados en intervenciones coronarias percutáneas (ICP), por millón de habitantes y distribución por comunidades autónomas. BFA: balón farmacoactivo.




Figura S2. Detalle de tipo de dispositivo usado en intervenciones coronarias percutáneas (ICP) en los 85 centros que han comunicado el 100% de información de estas variables. Panel izquierdo: dispositivos en ICP en 2025. Panel derecho: tipos de balones farmacoactivos (BFA). El 99,8% de los *stents* fueron farmacoactivos. Adicionalmente se comunicaron 125 *stents* dedicados de bifurcación y 175 *stents* bioabsorbibles.




Figura S3. Intervenciones coronarias percutáneas (ICP) realizadas con apoyo de imagen intracoronaria: tomografías de coherencia ópticas (OCT) o ecografías intravasculares (IVUS) (pregunta directa realizada a los centros participantes).




Figura S4. Intervenciones coronarias percutáneas (ICP) realizadas con apoyo de guía de presión (GP) (pregunta directa realizada a los centros participantes).




Figura S5. Evolución histórica de tipo de válvula implantada en procedimientos de implante percutáneo de válvula aórtica.




Figura S6. Información adicional de procedimientos de implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI). Cuadrante superior izquierdo: escenario anatómico de implante de TAVI. Cuadrante superior derecho: participación de cirugía cardiaca en TAVI. Cuadrante inferior izquierdo: pacientes > 80 años. Cuadrante inferior derecho: acceso vascular en TAVI. Insuf.: insuficiencia; Qx: quirúrgico.




Figura S7. Procedimientos de cierre de orejuela por millón de habitantes y distribución por comunidades autónomas.

